


Videocapsule-onderzoek

Binnenkort zal bij u een videocapsule-onderzoek plaatsvinden. Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk om het slijmvlies van uw dunne darm in detail in beeld te brengen. In deze brochure kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt en hoe u zich hierop voorbereidt.



Videocapsule-onderzoek

De videocapsule is een capsule met een afmeting van 11 mm bij 27 mm (vergelijkbaar met een antibioticatablet). Deze capsule bevat een kleine fotocamera die twee foto's per seconde maakt. Nadat u de capsule hebt doorgeslikt, gaat deze via de normale route door uw slokdarm, maag en dunne darm naar uw dikke darm en verlaat uiteindelijk met de ontlasting het lichaam. Hiervan merkt u helemaal niets. Tijdens zijn route door uw lichaam maakt de capsule foto's van het slijmvlies van de dunne darm. Deze foto's worden direct naar een ontvanger gezonden. Daarom krijgt u tijdens dit onderzoek een band om uw middel met daarin een aantal sensoren, die met kabeltjes verbonden zijn met een ontvanger. Deze draagt u in een tasje om uw schouder. De foto's worden beoordeeld door de Maag-, Darm- en Leverarts.

Vorbereiding

- Als u ijzertabletten gebruikt (ferrofumaraat, ferrogradumet), moet u hiermee één week vóór het onderzoek stoppen. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.
- Ook mag u vanaf één week vóór het onderzoek geen middelen gebruiken die de darmwerking vertragen (Arestal, Imodium, Loperamide).
- Op de dag vóór het onderzoek mag u na de avondmaaltijd uitsluitend nog heldere vloeibare voedingsmiddelen gebruiken, zoals thee, bouillon, water, heldere vloeistoffen.
- Op de dag van het onderzoek moet u tussen 8.00 en 10.00 uur twee liter Kleanprep (laxeermiddel) drinken. Dit middel werkt laxerend. Blijf dus in de buurt van het toilet. Met het bijgevoegde recept krijgt u zakjes laxeerpoeder mee.

- Vanaf 10.00 uur op de dag van het onderzoek mag u ook niets meer drinken tot aan het onderzoek.
- Noodzakelijke medicijnen mag u wel met een slokje water innemen, maar tot maximaal 2 uur vóór het onderzoek.
- Op de dag van het onderzoek wordt u aangeraden om ruimzittende kleding te dragen, die uit twee delen bestaat , dus: broek of rok met shirt, blouse of trui. Ook wordt u verzocht om geen gebruik te maken van bodylotion.
- Zorgt u ervoor dat u een schoon katoenen T-shirt of hemd meeneemt naar het ziekenhuis. Dit is noodzakelijk voor het onderzoek.

Let op !

- Dit onderzoek kan niet worden uitgevoerd bij patiënten die zwanger zijn.
- Zolang de capsule zich in uw lichaam bevindt, mag u niet in de buurt komen van sterke magnetische velden, zoals bijvoorbeeld een MRI-scan. Het is daarom belangrijk om bij elke stoelgang te kijken of de capsule mee naar buiten is gekomen. Dit is normaal binnen drie dagen het geval. Heeft u de capsule drie dagen na inname nog niet gezien bij de ontlasting, neem dan contact op met uw behandelende specialist. Er zal dan een foto van uw buik worden gemaakt.

Dag van het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de opnamebalie van de Isala klinieken op locatie Sophia. U wordt naar de verpleegafdeling B1 gebracht. De afdeling krijgt bericht wanneer u naar de endoscopieafdeling (M 3.40) kunt komen voor het onderzoek.

Als u nog geen ponsplaatje heeft, dan kunt u dit voorafgaand aan het onderzoek laten maken in de centrale hal (bij de balie van Patiëntenregistratie).

Onderzoek

Op de endoscopieafdeling wordt over uw katoenen shirt een band om uw middel aangebracht. Daarin zitten sensoren die contact zullen maken met de videocapsule. De sensoren worden via kabeltjes verbonden met de ontvanger. Deze draagt u in een tasje om uw schouder. Vervolgens neemt u de videocapsule met een beetje water in. Hierna gaat u terug naar de verpleegafdeling. Daar blijft u de rest van de dag en nacht. Twee uur na inname van de capsule mag u wat helder vocht drinken. Vier uur na inname mag u een lichte lunch gebruiken. Vermijd tijdens het onderzoek lichamelijke inspanning of bukken, waardoor de band zou kunnen verschuiven.

Tijdens het onderzoek controleert de verpleegkundige regelmatig of het blauwe lampje op de ontvanger blijft knipperen. Als het lampje stopt met knipperen, kan er een probleem zijn met de batterijen. Waarschuw dan snel een verpleegkundige.

Na ongeveer 8 uur zijn de batterijen op. Het blauwe lampje gaat nu langzamer knipperen en stopt uiteindelijk met knipperen. De verpleegkundige zal dan, als u wakker bent, de gordel losmaken. U mag de kabels en de ontvanger nooit zelf loskoppelen.

Gedurende het onderzoek is er een kleine kans dat u buikklachten krijgt. Daarom blijft u na het onderzoek een nacht in het ziekenhuis. Mocht u last van uw buik krijgen, meld het dan aan de verpleegkundige. Overigens ondervinden de meeste patiënten geen enkele last van het onderzoek.

Na het onderzoek

Als u zich goed voelt, kunt u de volgende dag na het ontbijt (tegen 8.30 uur) weer naar huis.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is ongeveer twee weken later bij uw behandelende specialist bekend.

Mogelijke complicaties

Als u na het onderzoek lichamelijke klachten heeft, kunt u contact opnemen met de arts die het onderzoek heeft verricht. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoend Maag-, Darm- en Leverarts via de receptie van ons ziekenhuis.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de endoscopieafdeling. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de endoscopieafdeling. Die is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Isala klinieken

Locatie Sophia

Dokter van Heesweg 2

8025 AB Zwolle

Postbus 10400

8000 GK Zwolle

Endoscopieafdeling, M3.40

t (038) 424 56 37, tijdens kantooruren

t (038) 424 50 00, buiten kantooruren

Verpleegafdeling B1

t (038) 424 54 11

Verantwoording

Deze tekst is opgesteld door medewerkers van de endoscopieafdeling en de maag-, darm en leverartsen in samenwerking met de stafdienst Concerncommunicatie.



www.isala.nl